



مسمومیت با مواد مخدر

گروه هدف: بیمار و همراهان



تاریخ تدوین: ۹۶/۱۰/۱۵

تاریخ بازنگری: ۹۷/۸/۳۰

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

شماره بازنگری: ۳

شماره سند: 96-pH

واحد آموزش به بیمار

بیمارستان و زایشگاه خیریه جوادالائمه (ع)

اعتماد ابعاد جسمی، عاطفی و اجتماعی فرد معتاد را تحت تاثیر قرار داده و موجب مشکلات روانی، اجتماعی می گردد. بیش از ۷۵٪ افراد درمان شده، کم تر از ۶ ماه بعد دوباره مصرف مواد را از سر می گیرند. از جمله مداخلاتی که جهت پیشگیری از لغزش یا عود و کاهش اشتیاق می توان انجام داد.

استفاده از مدل مراقبت پیگیر می باشد که فرآیندی منظم و مستمر شامل چهار مرحله آشناسازی، حساس سازی، کنترل و ارزشیابی بوده که با برقراری ارتباط مؤثر و پیگیر با مددجو موجب قبول رفتارهای مداوم بهداشتی و کمک به حفظ بهبودی و ارتقای سلامتی وی می شود.



منبع: دانشنامه پزشکی، داخلی جراحی

آدرس:

مشهد - خیابان طبرسی - حد فاصل میدان و چهارراه

مقدم - بیمارستان و زایشگاه خیریه جوادالائمه (ع)

تلفن: ۰۵۱-۳۳۶۸۲۱۳۵-۷

نشانی سایت: www.jmhmc.ir

برخورد با فرد مسموم:

مهم ترین اقدام در این بیماران برقراری راه هوایی و در صورت دسترسی به اکسیژن، باید از آن نیز بهره گرفت. بسیاری از بیماران هیچ گونه تقلایی برای تنفس نداشته و دچار سیاهی در لبها و پوست خود شده اند. برای این بیماران باید سریعاً تنفس مصنوعی شروع شود.

اگر بیمار فاقد نبض است، باید ماساژ قلبی نیز شروع شود. پادزهر مسمومیت به نام نالوکسان شناخته می شود که با تجویز وریدی آن تمامی علائم بیمار برمی گردد. تجویز این دارو باید توسط پرسنل درمانی و ترجیحاً در بیمارستان انجام شود.



مسمومیت با مواد مخدر:

مواد مخدر دسته بزرگی از مواد را شامل می‌شوند، اما موادی که مورد بحث در این ستون قرار می‌گیرد مواد مخدر از خانواده مرفین است. موادی که به صورت طبیعی، نیمه صنعتی و صنعتی تولید می‌شوند و دارای اثراتی مشابه با مرفین هستند.

تریاک ماده‌ای با منشأ طبیعی و قدمتی طولانی در ایران است. موادی مانند هروئین نیمه صنعتی است، در حالی که متادون، ترامادول و دیفنوکسیلات از ترکیبات صنعتی به شمار می‌روند. ایران مسیر ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به اروپاست، بنابراین بخشی از این مواد در ایران نشست می‌کند! یکی از مسمومیت‌های رایج در ایران مسمومیت با تریاک و مشتقات آن است. تریاک به عنوان مسکن از قدیم‌الایام استفاده می‌شد، اما کم‌کم این کاربرد به نوعی استفاده ابزاری تغییر کرده است. بسیاری از افراد مسن از تریاک برای کنترل دردهای مفصلی استفاده می‌کنند. کاربردهای دیگری هم که ناشی از برداشت عامه مردم در کنترل قندخون و تاثیرات آن در مشکلات جنسی است باعث شده که کاربران این ماده افیونی به شدت افزایش یابد.

کاربرد:

تریاک که ماده اصلی آن مرفین است کاربردهای پزشکی داشته و برای درمان بسیاری از بیماری‌ها استفاده دارد. مرفین علاوه بر این که در کنترل درد کاربرد دارد، باعث آرام بخشی در بیمار شده و از شدت استرس ناشی از درد قلبی می‌کاهد.



مرفین در بیمارانی که دچار ورم در ریه های خود شده‌اند به عنوان درمانی کمکی استفاده می‌شود. این داروها در سرکوب سرفه، درمان اسهال و انجام بیهوشی بیماران جراحی نیز کاربرد دارند. مرفین و مشتقاتش به روش‌های خوراکی، استنشاقی و تزریقی استفاده می‌شوند. در تمام روش‌های مصرف، به خوبی جذب می‌شوند. این مواد عموماً در کبد دچار تغییراتی شده و با ادرار دفع می‌شوند. در دوران بارداری از مادر به جنین منتقل شده و ممکن است نوزاد پس از تولد دچار علائم کمبود یا همان علائم ترک باشد.

علائم و نشانه های فیزیکی و جسمی سوء مصرف

مواد:

- (۱) سرخ شدن چشم ها
- (۲) نگاه های مات به مدت طولانی
- (۳) نامفهوم و جویده شدن طرز صحبت
- (۴) عدم تعادل در حرکات
- (۵) کم شدن توجه به نظافت
- (۶) محل های متعدد تزریق سرنگ در بدن
- (۷) غیبت های مکرر از کلاس درس و کاهش علاقه به تحصیل
- (۸) بی قراری شدید
- (۹) تغییرات ناگهانی خُلق
- (۱۰) به مشام رسیدن بوهای غیر عادی از دهان یا لباس
- (۱۱) وجود سوزن ها و سنجاق های سیاه شده، قاشق خمیده و دود گرفته و ورق آلومینیومی
- (۱۲) لوله های خالی خودکار، کبریت نیم سوخته در محل های غیر معمول
- (۱۳) طولانی شدن زمان ماندن در دستشویی و حمام
- (۱۴) ناپدید شدن بعضی اشیاء در خانه
- (۱۵) خواب آلودگی
- (۱۶) تغییر دوستان
- (۱۷) تأخیر در حرکات و کند شدن رفتارها