




خارج کردن پلاتین

گروه هدف: بیمار و همراهیان



تاریخ تدوین: ۹۶/۱/۱۵

تاریخ بازنگری: ۹۸/۸/۱۵

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰/۱/۱۵

شماره بازنگری: ۲

شماره سند: ۹ p-pH

واحد آموزش به بیمار

بیمارستان و زایشگاه خیریه جوادالائمه(ع)



منبع: داخلی جراحی

WWW.ONIM.NIH.GOV/MEDLINPLUS

آدرس:

مشهد - خیابان طبرسی - حد فاصل میدان و چهارراه
مقدم - بیمارستان و زایشگاه خیریه جوادالائمه (ع)

تلفن: ۰۵۱-۳۳۶۸۲۱۳۵-۷

نشانی سایت: www.jmhc.ir

مراقبت های پرستاری پس از خارج کردن پلاتین:

- ۱- تعویض پانسمان به روش استریل
- ۲- در صورت درد زیاد تب و ورم ترشح چرکی و قرمزی سریع به پزشک مراجعه کنید.
- ۳- مصرف داروهای تجویز شده به درستی و در ساعت مشخص
- ۴- در صورت رفتن به حمام روی محل عمل با پلاستیک پوشیده شود تا خیس نشود.
- ۵- پس از گذشت ۱۰-۱۴ روز جهت ویزیت و کشیدن بخیه مراجعه شود.
- ۶- در صورت تجویز فیزیوتراپی جهت بازگشت حرکت عضو شکسته مراجعه کند.
- ۷- تا هنگامی که پزشک اجازه نداده است بر روی عضوی که پلاتین خارج شده وزن گذاشته نشود. پلاتین خارج شده دور انداخته می شود و قابل استفاده نیست.



خارج کردن پلاک:

امروزه بسیاری از شکستگی ها با عمل جراحی درمان می شوند و در اغلب این شکستگی ها برای بی حرکت کردن قطعات شکسته شده از وسایل فلزی استفاده می شود که به آن ها ایمپلنت می گویند. از انواع مختلفی از ایمپلنت ها استفاده می شود.

به ابزارهای فلزی که جراح ارتوپد در درون بدن کار می گذارد ایمپلنت می گویند. این که پزشک معالج از کدامیک از وسایل برای بی حرکت کردن شکستگی استفاده کند بسته به محل و شکل شکستگی متفاوت است.

انواع ایمپلنت:

وایر یا سیم، راد یا میله، نیل یا میخ، پیچ و اکسترنال فیکساتور.



گاهی اوقات به خصوص در شکستگی های دست بعد از جراحی سرپین در خارج از پوست باقی می ماند. در این موارد پس از گذشت چند هفته که قطعات شکسته شده به اندازه کافی به یکدیگر می چسبند پین ها در کلینیک به توسط پزشک ارتوپد خارج می شوند.



در چه موارد دیگری پلاتین بعد از جراحی

شکستگی باید خارج شود؟

فشار موضعی پیچ و پلاک: اگر قسمتی از ایمپلنت از استخوان بیرون زده و برجسته باشد و این بیرون زدگی زیر پوست لمس شده و بیمار را اذیت کند یا روی مفصل کناری یا عروق و اعصاب یا تاندون ها یا عضلات اطرافش فشار آورده، مانع کارکرد مناسب آن ها شود. این ایمپلنت باید به وسیله عمل جراحی از بدن خارج شود.

جا به جا شدن پلاتین: اگر ایمپلنت از جای خود جا به جا شود و بعد از جا به جایی مشکلات حالت قبل را به وجود آورد باید خارج شود.

عفونت استخوان: گاهی اوقات محل جراحی عفونت می کند. در این موارد میکروب ها به سطح فلزی ایمپلنت چسبیده و غشایی در اطراف خود ترشح می کند که مانع از نفوذ آنتی بیوتیک ها می شود.

این پدیده موجب می شود درمان عفونت مشکل شود. در این موارد اگر ایمپلنت در جای خود محکم باشد و قطعات شکسته شده را به خوبی در جای خودشان نگه داشته باشد و شکستگی جوش نخورده باشد پزشک جراح ایمپلنت را خارج می کند.



اگر پلاتین گذاشته شده قطعات استخوان شکسته را به خوبی نگه ندارد باید خارج شود.